d'après Durozoy, 1973

PAC06L



C^5	Santonien	Calc. gréseux Marnes sableuses — Au Sud de l'Etang de Berre: 300m. Plus réduit au N. — Affleure seulement sur la bordure Sud de la Feuille de Salon Calcaires compacts à débris de Rudistes Calcaires grossiers rognoneux à Rudistes
C^4	Turon. sup.	Calcaires à Hippurites Grès roux à argile ligniteuse — Au Sud de l'Etang de Berre 80 à 100m. Réduit au N. — Affleure seulement sur la Bordure Sud
n^4u	Barrémien à faciès urgonien	Calcaires à Rudistes Massifs des Costes. Calcarénites (tronqué par l'érosion) — 250 m à 300 m Massif de la Fare: Calcaranites à lentilles coralligènes, Calcarenites à Algues } Ouest; Calcaire compact sublitho à Rudistes } à l'Est
n^4	Formation de transition — Hauter. | Barrem.	Calcaires marneux noduleux à lentilles ou barres Calc. Calcaires à gros silex roux en bancs épais ou plaquettes Calcaires beiges alternant avec calcaires argileux
n^3c	Hauterivien supérieur	Calc. en gros bancs gris beige microcristallins à accidents sicileux et hard-grounds Calc. noduleux en petits bancs — 300 à 400 m Calc. gris ou roux en gros bancs Calcaires noduleux gris ou beiges Marno calcaires en miches
n^3b	Hauteriv. moy.	Calcaires biodétritiques glauconieux alternance de calc. argileux gris ou jaunes — 80 m à 120 m
n^3a	Hauteriv. inf.	Calc. en gros bancs en miches à passes marneuses rognoneuses — 30 m à l'Ouest, 150 m à l'Est Intercalations plus marneuses Calc. jaune beige alternant avec calcaires argileux
n^2	Valanginien	Calcaires altérés en boules et marnes, calcaires beiges en plaquettes, calcaires argileux alternant avec marnes — 200 m à l'Ouest, 350 m à l'Est
n^1	Berriasien	Calc. argileux à niveaux marneux Calc. argileux Calc. sublithogr. gris ou beige en gros bancs à lits noduleux Minces lits d'argile à la base — 150 à 200 m